Operador Nacional do Sistema Elétrico

III WorkEta

Aplicações em Recursos Hídricos
Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS

Marcio Cataldi
cataldi@ons.org.br

- **Apresentação do ONS;**
- **Utilização dos campos de modelagem numérica do CPTEC/INPE na elaboração os produtos de rotina do ONS;**
- **Projetos desenvolvidos pelo ONS no aprimoramento de algumas variáveis provenientes da modelagem numérica disponibilizada pelo CPTEC/INPE;**
- **Projetos futuros do ONS relacionados com os produtos de modelagem numérica do CPTEC/INPE.**

Sistema Interligado Nacional

	2008	2013
Cap. Instalada – MW	89.075	120.800
Hidro	74.370	81.552
Termo-convencional	12.270	26.664
Termo-nuclear	2.007	2.007
Outras	428	10.577
Participação Hidro	83%	68%

RECURSOS

REQUISITOS

RESTRIÇÕES

Consumo

RECURSOS

**ENERGIA ARMAZENADA
NOS RESERVATÓRIOS**

**ENERGIA NATURAL
AFLUENTE AOS
RESERVATÓRIOS**

PRESENTE

FUTURO

Decisão

Usar água

Energia Afluente Futura

Resultado

OK

déficit

Economizar água

vertimento

OK

Sistema Interligado Nacional - Operação

Representação da Incerteza Hidrológica

- Atualmente o ONS utiliza de forma subjetiva as previsões dos modelo ETA e Global para:
 - a elaboração de Boletins Meteorológicos para os subsistemas integrantes do SIN, em um horizonte de 3 a 5 idas;
 - a quantificação da previsão de chuva nas bacias do SIN, para um horizonte de 3 dias.

- A previsão climática de consenso é um dos insumos utilizados para a elaboração de um boletim climático mensal.

Produtos de Rotina

BONS - Avaliação de Curto Prazo da Operação - Boletim Meteorológico Diário - Windows Internet Explorer

http://www.ons.org.br/operacao/boletim_meteorologico_diario.aspx

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

ons BONS - Avaliação de Curto Prazo da Operação - Boleti...

Natal	Claro.	Claro apresentando períodos de parcialmente nublado.
Fortaleza	Claro.	Claro apresentando períodos de parcialmente nublado.
Teresina	Parcialmente nublado apresentando períodos de nublado.	Claro apresentando períodos de parcialmente nublado.
São Luís	Claro apresentando períodos de parcialmente nublado.	Claro apresentando períodos de parcialmente nublado.

Fonte
 CPTEC/INPE: modelos numéricos
 FURNAS: imagens do satélite Goes-12
 INMET: temperaturas registradas nas capitais

[Topo](#)

Previsão do Tempo (até dia 07/11/2009)

Frente fria localizada no sul do Rio Grande do Sul, ocasionando nebulosidade e chuva fraca nesta região.

Sistema de alta pressão atuando em Santa Catarina, Paraná e nos estados da região Sudeste predominando céu claro.

Subsistema Sul
 A presença da frente fria no sul do Rio Grande do Sul até o dia 6 e a atuação de áreas de instabilidade permanecem ocasionando chuva nas bacias dos rios Jacuí e Uruguai até o dia 6, e nas bacia dos rios Iguazu e Paranapanema e no trecho incremental a Uhe Itaipu a partir do dia 6. No decorrer do dia 7 a frente avança pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina intensificando a precipitação na bacia do rio Uruguai e Iguazu. Temperatura estável em Porto Alegre no dia de hoje, em elevação no dia seguinte, e em declínio no dia 6. Nas demais capitais temperatura estável, e em declínio no dia 6.

Subsistema Sudeste
 Nos próximos dias permanece o predomínio de céu claro, sendo que o sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro apresentarão aumento de nebulosidade no dia de hoje, seguido de pancadas de chuva e o estado de São Paulo esta mesma condição até o dia 7. A precipitação atinge pontos isolados das bacias dos rios Grande, Paraíba do Sul e Tietê. Temperatura em elevação, e em declínio em São Paulo no dia 6.

Subsistema Centro-Oeste/Norte
 Durante o dia de hoje a maior parte destes subsistemas permanecerá com nebulosidade variável e chuva fraca/moderada, atingindo as bacias dos rios Manso, Paranaíba e Tocantins. A partir do dia 06 o centro-norte de Goiás e o Distrito Federal apresentarão diminuição de nebulosidade, passando a predominar céu claro a seguir. O restante dos subsistemas permanecerá com nebulosidade variável e precipitação, atingindo a bacia do rio Manso e a subbacia do rio Araguaia. Temperatura em declínio hoje, entrando em suave elevação amanhã em Brasília e no dia 07 em Goiânia.

Subsistema Nordeste
 Nos próximos dias permanece o predomínio de céu claro na maior parte deste subsistema, exceto o litoral da Bahia e o o centro-sul dos estados do Piauí e Maranhão que permanecerão com nebulosidade moderada a abundante isoladas.

- [Topo](#)

Concluído

Intranet local 100%

ONS - Avaliação de Curto Prazo da Operação - Boletim de Precipitação - Windows Internet Explorer

http://www.ons.org.br/operacao/boletim_precipitacao.aspx

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

ONS - Avaliação de Curto Prazo da Operação - Boleti...

Busca BUSCA AVANÇADA

INSTITUCIONAL

CONHEÇA O SISTEMA

ATUAÇÃO DO ONS SOBRE O SIN

PROCEDIMENTOS DE REDE

AMPLIAÇÕES E REFORÇOS NA REDE BÁSICA

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES FUTURAS DA OPERAÇÃO

AVALIAÇÃO DE CURTO PRAZO DA OPERAÇÃO

- Estudos de Segurança Operacional
- Diretrizes para a Operação Eletroenergética
 - Diretrizes para a Operação Elétrica - Quadrimestral e Mensal
 - Programa Mensal da Operação - PMO
 - Exportação aos Sistemas Elétricos Argentino e Uruguaio
 - Reserva de Potência Operativa
 - Hidrologia
 - Meteorologia

RESULTADOS DA OPERAÇÃO

ANÁLISE DA CARGA DE ENERGIA E DEMANDA

INDICADORES DE DESEMPENHO DO SIN

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

INTEGRAÇÃO DE INSTALAÇÕES AO SIN

ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO

Início > Avaliação de Curto Prazo da Operação > Diretrizes para a Operação Eletroenergética > Meteorologia > Boletim de Precipitação

Boletim de Precipitação

VISÃO GERAL DO ONS

Bacia	Trecho	Dia		
		06/11	07/11	08/11
Uruguaí		20	35	20
Jacuí		25	40	10
Iguaçu	Montante - Foz do Areia	2	15	20
	Jusante - Foz do Areia	10	30	30
Paraná	Montante - Jupuí	10	5	5
	Jusante - Jupuí	10	25	30
Paranapanema	Montante - Capivara	5	25	25
	Jusante - Capivara	10	30	30
Tietê	Montante - Barra Bonita	2	2	5
	Jusante - Barra Bonita	5	5	5
Paraíba do Sul	Montante - Funil	2	0	2
	Jusante - Funil	2	0	2
Grande	Montante - Furnas	2	0	2
	Jusante - Furnas	5	2	2
Paranaíba	Montante - Emborcação	5	0	0
	Jusante - Emborcação	5	0	2
São Francisco	Montante - Três Marias	0	0	0
	Três Marias - Sobradinho	0	0	0
Tocantins	Montante - Serra da Mesa	2	0	2
	Serra da Mesa - Lajeado	2	0	0
	Lajeado - Tucuruí	10	5	2

Concluído

Intranet local 100%

Produtos de Rotina

ONS - Avaliação de Curto Prazo da Operação - Boletim Climático Mensal - Windows Internet Explorer

http://www.ons.org.br/operacao/boletim_climatico_mensal.aspx

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

ONS - Avaliação de Curto Prazo da Operação - Boleti...

Setembro/09 Outubro/09 Novembro/09

1 25 50 100 150 200 250 300 400

Figura 3.2: Climatologia de precipitação (mm). Fonte: INMET - 1961/1990

A previsão climática de consenso para o trimestre outubro, novembro e dezembro de 2009, elaborada a partir das previsões realizadas pelo modelo Global do CPTEC e pelos modelos dos centros Americanos e Europeus, indica maior probabilidade de chuvas variando entre a média e acima da média na região Sul, nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul e no sul do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de Goiás e do Mato Grosso. Na Bacia do Rio Parnaíba, no trecho da bacia do rio São Francisco a jusante da Uhe Sobradinho e no trecho da bacia do rio Tocantins próximo a Uhe Tucuruí a previsão indica precipitação variando entre a média e abaixo da média. Nas demais áreas do SIN, a distribuição de probabilidades indica totais pluviométricos sazonais em torno da normal climatológica.

Neste trimestre, os valores de temperatura estão previstos na categoria próxima da normal climatológica nas Regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste e no sul das regiões Norte e Nordeste, com temperaturas variando entre a média e acima da média climatológica sobre o norte das regiões Nordeste e Norte.

BACIAS HIDROGRÁFICAS	PREVISÃO
PARANÁIBA	Precipitação: entre a média e acima da média histórica no trecho a jusante da UHE Itumbiara. Próxima da média nos demais trechos.
GRANDE	Precipitação: entre a média e acima da média histórica.
TOCANTINS	Precipitação: entre a média e abaixo da média histórica no trecho próximo a UHE Tucuruí. Próxima da média nos demais trechos.

Concluído Intranet local 100% 11

- A previsão horária de temperatura é utilizada com insumo na previsão de carga, em conjunto com outras variáveis, a partir de um modelo matemático baseado em redes Neurais.

ANNSTLF
Modelo multivariado de
previsão de carga baseado em
técnicas de Redes Neurais

Previsão de carga em patamares de 1/2 hora
para um horizonte de até 10 dias

**Programação
Diária**

- ➔ Utilização de informações de **temperatura (verificadas e previstas – até 15 dias a frente) – Modelos ETA e Global do CPTEC**

Produtos de Rotina

Data	Temp
20101029/2100	26.3
20101029/2200	25.5
20101029/2300	24.8
SAO PAULO, SP, BR	
20101025/0000	17.0
20101025/0100	15.7
20101025/0200	15.3
20101025/0300	15.0
20101025/0400	14.7
20101025/0500	14.2
20101025/0600	14.0
20101025/0700	13.6
20101025/0800	13.8
20101025/0900	13.7
20101025/1000	16.3
20101025/1100	18.2
20101025/1200	20.2
20101025/1300	22.0
20101025/1400	23.4
20101025/1500	24.5
20101025/1600	24.7
20101025/1700	24.5
20101025/1800	24.2
20101025/1900	23.5
20101025/2000	22.1
20101025/2100	20.2
20101025/2200	19.0
20101025/2300	18.3
20101026/0000	17.5
20101026/0100	16.8
20101026/0200	16.3
20101026/0300	16.1
20101026/0400	15.8
20101026/0500	14.9
20101026/0600	14.6
20101026/0700	14.1
20101026/0800	13.9
20101026/0900	13.6
20101026/1000	16.3
20101026/1100	18.2
20101026/1200	19.1

Produtos de Rotina

➤ Utilização da previsão de vento para o parque eólico de Tramandai - RS

Intervalo	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4
20091106/0000	-50.17	-29.97	46	19.59
20091106/0100	-50.17	-29.97	60	3.71
20091106/0200	-50.17	-29.97	68	4.17
20091106/0300	-50.17	-29.97	68	3.73
20091106/0400	-50.17	-29.97	82	7.80
20091106/0500	-50.17	-29.97	66	4.08
20091106/0600	-50.17	-29.97	60	4.88
20091106/0700	-50.17	-29.97	52	7.70
20091106/0800	-50.17	-29.97	71	1.68
20091106/0900	-50.17	-29.97	118	1.78
20091106/1000	-50.17	-29.97	136	1.46
20091106/1100	-50.17	-29.97	83	3.94
20091106/1200	-50.17	-29.97	69	4.62
20091106/1300	-50.17	-29.97	66	5.44
20091106/1400	-50.17	-29.97	75	5.99
20091106/1500	-50.17	-29.97	78	6.74
20091106/1600	-50.17	-29.97	72	7.53
20091106/1700	-50.17	-29.97	69	7.58
20091106/1800	-50.17	-29.97	62	8.14
20091106/1900	-50.17	-29.97	58	8.35
20091106/2000	-50.17	-29.97	56	7.06
20091106/2100	-50.17	-29.97	54	5.74
20091106/2200	-50.17	-29.97	56	6.11

- Utilização da Previsão quantitativa de precipitação do modelo ETA para 10 dias a frente.

- Utilização da Previsão de precipitação do modelo ETA para 10 dias a frente.

32% da energia coberta por modelagem chuva-vazão

41% da energia coberta por modelagem chuva-vazão (perspectiva 2010)

90% da energia coberta por modelagem chuva-vazão

Produtos de Rotina

- Concorrência de Modelos - 2004

BACIA / TRECHO	EMPRESAS	NOME DO MODELO	METODOLOGIA
<p>Iguaçu</p>	<p>UFF LACTEC PUC-Rio</p>	<p>Fuzzy Recorrente SMAP Redes Neurais</p>	<p>Inteligência Artificial Físico Concentrado Inteligência artificial</p>
<p>Itumbiara - São Simão</p>	<p>RHAMA PUC-Rio</p>	<p>MGB-IPH Regressão Dinâmica</p>	<p>Físico Distribuído Estocástico</p>
<p>Rosana - Porto Primavera - Itaipu</p>	<p>FCTH RHAMA PUC-Rio</p>	<p>SMAP-MEL MGB-IPH Regressão Dinâmica</p>	<p>Físico Concentrado & Estocástico Físico Distribuído Estocástico</p>

- **Modelo MPCV – Combinação de Redes Neurais, Data Mining e modelagem Estocástica (Previvaz/CEPEL) aplicado à Bacia do rio Uruguai (desenvolvimento interno)**
- **Modelo SMAP – Aplicação para as bacias dos rios Grande e Paranapanema (desenvolvimento interno)**
- **Modelo Neuro3M – Modelo de Redes Neurais aplicado a cabeceira do rio São Francisco (trecho a montante da UHE Três Marias) – desenvolvimento interno**

➤ Exemplo de melhoria na qualidade da modelagem chuva-vazão com a inclusão da precipitação

Produtos de Rotina

➤ Exemplo de melhoria na qualidade da modelagem chuva-vazão com a inclusão da precipitação

➤ Artigo publicado na Revista Brasileira de Hidrologia pelo ONS em parceria com o CPTEC sobre a identificação de erros sistemáticos na previsão de precipitação do modelo ETA. Tendência de superestimar valores baixos de precipitação e subestimar valores muito altos.

- Bacia do rio Grande

➤ Previsão de precipitação Realizada pelo modelo numérico de previsão de tempo ETA.

➤ Chuva média diária em cada sub-bacia calculada a partir de média aritmética.

➤ Precipitação diária prevista para 10 dias à frente, no período de 1996 a 2003, com previsões efetuadas sempre com início às quartas-feiras.

Verifica-se, em todas as sete sub-bacias, uma tendência de superestimativa dos valores de precipitação prevista (viés da previsão).

Estudos realizados pelo ONS

Bacia do rio Grande

Sub-bacia	Precipitação		Pprev/Pobs
	Média Anual (mm)		
	Observada	Prevista	
1 - Camargos	1.434,6	1.820,3	1,27
2 - Funil	1.400,4	1.774,8	1,27
3 - Porto dos Buenos	1.499,5	2.154,4	1,44
4 - Paraguaçu	1.435,6	1.838,3	1,28
5 - Furnas	1.333,9	2.013,3	1,51
6 - Fazenda Capão Escuro	1.532,1	1.716,6	1,12
7 - Porto Colômbia	1.476,6	1.614,8	1,09

CAMARGOS

PORTO COLÔMBIA

- Bacia do rio Grande – Densidade dos postos pluviométricos

Com vistas à identificação e remoção deste viés, foram realizados estudos, para cada uma das sete sub-bacias consideradas no modelo. Para isso, foram adotadas as seguintes premissas:

- Considera-se o total de precipitação prevista acumulada no período e não apenas seus valores diários (o modelo ETA, de forma geral, consegue prever, com razoável qualidade, a ocorrência ou não de chuvas nos próximos dias, porém, além da tendência a superestimar os totais, em diversas vezes há uma defasagem entre a previsão e a observação dos dias de chuva com maior intensidade).

- Consideraram-se períodos distintos do ano na identificação e remoção do viés, já que o viés e os sistemas meteorológicos que ocasionam precipitação não têm o mesmo padrão ao longo dos meses.

- ✓ agosto a novembro.

- ✓ dezembro e janeiro.

- ✓ fevereiro e março.

- ✓ abril a julho.

Estudos realizados pelo ONS

- Bacia do rio Grande – Densidade dos postos pluviométricos

CAMARGOS - Período Agosto/Novembro

CAMARGOS - Período Agosto/Novembro

Constantes a e b e limites de aplicação das equações obtidas para remoção do viés da previsão de precipitação

Sub-bacia	Período			Período			Período			Período		
	Agosto/Novembro			Dezembro/Janeyro			Fevereiro/Março			Abril/Julho		
	a	b	Limite (mm)	a	b	Limite (mm)	a	b	Limite (mm)	a	b	Limite (mm)
1 - Camargos	0,00392	0,42709	146,2	0,00179	0,69219	172,0	0,00127	0,65057	275,1	0,00725	0,59979	55,2
2 - Funil	0,00443	0,44497	125,3	0,00072	0,80994	264,0	0,00225	0,57288	189,8	0,01544	0,26893	47,3
3 - Porto dos Buenos	0,00351	0,35244	184,5	0,00238	0,47241	221,7	0,00155	0,49249	327,4	0,00814	0,39126	74,8
4 - Paraguaçu	0,00341	0,47233	154,7	0,00203	0,63334	180,6	0,00308	0,52903	152,9	0,00795	0,48164	65,2
5 - Furnas	0,00119	0,52182	401,8	0,00204	0,47112	259,3	0,00152	0,51448	319,4	0,00745	0,44803	74,1
6 - Fazenda Capão Escuro	0,00487	0,43763	115,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 - Porto Colômbia	0,00037	0,74494	689,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Estudos realizados pelo ONS

Estudos realizados pelo ONS

Camargos

Estudos realizados pelo ONS

Estudos realizados pelo ONS

FURNAS TOTAL

- Ensemble Multi-Model para as previsões climáticas do verão de 2007

Bacia do rio Iguaçu

Bacia do rio Grande

Bacia do rio São Francisco

- Correção da previsão de precipitação utilizando redes Neurais e as outras variáveis prognósticas do modelo ETA
- Premissa: a precipitação é **um dos piores campos prognósticos** dos modelos de previsão numérica de tempo, devido, principalmente, ao grande número de parametrizações envolvidas neste processo.
- Utilização de Redes Neurais do tipo Multi Layer Perceptron (MLP) com treinamento Bayesiano para a correção da previsão de chuva do modelo ETA, utilizando outras variáveis prognósticas do próprio modelo ETA.
- O desempenho dos modelos é medido em termos do erro médio quadrático, do inglês mean squared error (MSE), obtido para o conjunto de teste. Matematicamente, esta estatística é dada por:

$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (P_i^{est} - P_i^{real})^2$$

Projetos em andamento

- Correção da previsão de precipitação utilizando redes Neurais e as outras variáveis prognósticas do modelo ETA – Resultados bacia do rio Grande

Tabela 59 – Resumo dos Resultados para a bacia do Rio Grande – Modelos corretores

para 1 até 6 dias à frente

Período Úmido												
Passos a Frente	1		2		3		4		5		6	
Estatísticas	NN	ETA	NN	ETA	NN	ETA	NN	ETA	NN	ETA	NN	ETA
MSE	0.83	0.97	6.48	15.11	5.08	6.42	3.69	7.77	2.71	0.97	2.64	1.44
Período Seco												
Passos a Frente	1		2		3		4		5		6	
Estatísticas	NN	ETA	NN	ETA	NN	ETA	NN	ETA	NN	ETA	NN	ETA
MSE	0.81	0.57	7.34	12.95	4.13	11.91	2.66	5.88	2.79	0.90	4.27	1.15
Período de Transição Seco-Úmido												
Passos a Frente	1		2		3		4		5		6	
Estatísticas	NN	ETA	NN	ETA	NN	ETA	NN	ETA	NN	ETA	NN	ETA
MSE	13.28	103.32	29.27	52.20	14.85	21.48	9.43	93.90	15.00	32.72	16.02	41.04
Período de Transição Úmido-Seco												
Passos a Frente	1		2		3		4		5		6	
Estatísticas	NN	ETA	NN	ETA	NN	ETA	NN	ETA	NN	ETA	NN	ETA
MSE	26.79	14.61	23.79	18.96	28.90	37.25	2.91	2.03	5.03	3.85	35.53	20.79

Tabela 60 – Resumo dos Resultados para a bacia do Rio Grande – Modelos corretores

para 7 até 10 dias à frente e resultados globais

Período Úmido											
Passos a Frente	7		8		9		10		Total		Ganho (%)
Estatísticas	NN	ETA	NN	ETA	NN	ETA	NN	ETA	NN	ETA	
MSE	2.32	4.98	1.66	1.52	4.29	7.67	4.92	10.92	3.46	5.78	40.07
Período Seco											
Passos a Frente	7		8		9		10		Total		Ganho (%)
Estatísticas	NN	ETA	NN	ETA	NN	ETA	NN	ETA	NN	ETA	
MSE	3.31	3.56	2.61	3.59	6.42	5.82	3.67	8.96	3.80	5.53	31.31
Período de Transição Seco-Úmido											
Passos a Frente	7		8		9		10		Total		Ganho (%)
Estatísticas	NN	ETA	NN	ETA	NN	ETA	NN	ETA	NN	ETA	
MSE	12.15	8.32	15.84	41.78	70.80	54.96	12.83	24.15	20.95	47.39	55.79
Período de Transição Úmido-Seco											
Passos a Frente	7		8		9		10		Total		Ganho (%)
Estatísticas	NN	ETA	NN	ETA	NN	ETA	NN	ETA	NN	ETA	
MSE	6.49	5.42	34.32	10.43	30.02	8.18	13.09	19.52	20.69	14.10	-31.82
TOTAL - TODOS OS PERÍODOS E TODAS SUB-BACIAS									12.22	18.20	32.83

Projetos em andamento

- Correção da previsão de precipitação utilizando redes Neurais e as outras variáveis prognósticas do modelo ETA – Resultados bacia do rio Grande

Precipitação observada

Código	Posto	Longitude	Latitude
2145042	Alfenas	-45,94417	-21,47194
2145030	Boa Esperança	-45,56889	-21,08806
2145041	Campos Gerais	-45,75722	-21,23778
2045020	Candéias	-45,27417	-20,76
2145044	Carmo da Cachoeira	-45,22139	-21,46111
2046028	Carmo do Rio Claro	-46,15	-20,96083
2145032	Coqueiral	-45,44861	-21,19278
2145047	Fama	-45,83028	-21,405
2045021	Formiga	-45,4175	-20,45806
2045028	Guapé	-45,92472	-20,76306
2045026	Illicínea	-45,82361	-20,94528
2146027	Juréia	-46,36194	-21,27917
2145022	Paraguaçu	-45,44028	-21,78639
2044027	Ponte Fernão Dias	-44,78333	-20,74083
2045004	Santana do Jacaré	-45,13222	-20,90306
2045031	SE Pimenta	-45,71667	-20,43333
2145043	Três Pontas	-45,50111	-21,36139
2046027	UHE Furnas	-46,32361	-20,67583
2146084	UHE Poço Fundo	-46,11667	-21,81667
2145007	Usina Couro do Cervo	-45,17028	-21,34361
2145021	Usina Nepumoceno	-45,16722	-21,2575

- Correção da previsão de precipitação utilizando redes Neurais e as outras variáveis prognósticas do modelo ETA – Resultados bacia do rio Grande

Precipitação Prevista

Variáveis utilizadas para a correção

<i>Variável</i>	<i>Unidade</i>
<i>Pressão atmosférica reduzida ao nível do mar</i>	<i>hPa</i>
<i>Temperatura do ar a 2 m</i>	<i>K</i>
<i>Temperatura do ponto de orvalho a 2m</i>	<i>K</i>
<i>Componente zonal do vento a 10m</i>	<i>m/s</i>
<i>Componente meridional do vento a 10m</i>	<i>m/s</i>
<i>Fluxo de calor latente médio na superfície</i>	<i>w/m²</i>
<i>Temperatura do solo a 0,1 m de profundidade</i>	<i>K</i>
<i>Temperatura do solo a 2 m de profundidade</i>	<i>K</i>
<i>Evaporação potencial na superfície</i>	<i>m</i>
<i>Albedo na superfície</i>	<i>Adimensional variando entre 0 e 1</i>
<i>Componente zonal do vento no nível de 850 hPa</i>	<i>m/s</i>
<i>Componente zonal do vento no nível de 500 hPa</i>	<i>m/s</i>
<i>Componente zonal do vento no nível de 200 hPa</i>	<i>m/s</i>

- Umidade integrada entre 1000 hPa e 850hPa;
- Saturação (temperatura do ar – temperatura do ponto de orvalho);
- Instabilidade estática [temperatura do ar (2m) – temperatura do ar (850 hPa)];
- Variação do vento com a altura (200 hPa – 500 hPa);
- Variação do vento com a altura (500 hPa - 850 hPa).

Precipitação semanal acumulada nos anos de 2002 e 2003

Projetos em andamento

Previsão de vazões utilizando técnicas de RN para a bacia do rio Grande

- Experimento 1

- Experimento 2

- Experimento 3A

- Experimento 3B e 3C

Previsão de vazões utilizando técnicas de RN para a bacia do rio Grande

Previsão de vazões utilizando técnicas de RN para a bacia do rio Grande

Previsão de vazões utilizando técnicas de RN para a bacia do rio Grande

<i>Erros relativos médios na semana operativa (%)</i>			
	<i>Treinamento</i>	<i>Validação</i>	<i>Teste</i>
<i>Experimento 1</i>	20,6	28,8	23,0
<i>Experimento 2</i>	20,4	29,3	23,1
<i>Experimento 3A</i>	11,9	18,3	13,3
<i>Experimento 3B</i>	11,9	18,3	28,5
<i>Experimento 3C</i>	11,9	18,3	17,2

Projetos em andamento

Correção de viés para a bacia do rio Paranapanema

Projetos em andamento

Correção de viés para a bacia do rio Paranapanema

Para esta bacia não foi observado um viés nas previsões de precipitação em todas as subbacias e nem em todos os períodos do ano

Modelo Chuva-vazão para a bacia do rio Paranapanema

- A previsões de precipitação do modelo ETA para um horizonte de 10 dias, mesmo sem a correção de viés, trouxeram melhorias nas previsões de vazão, em relação àquelas obtidas com modelos estocásticos “vazão-vazão”, em todos os locais onde a metodologia chuva-vazão foi aplicada;
- No entanto, em algumas situações, para que estes resultados fossem melhores, houve a necessidade de se remover o viés da previsão de precipitação do modelo Eta;
- Esta remoção não pôde ser aplicada para todas as bacias do SIN, já que em alguns casos, ou em algumas épocas do ano, não foi observado nenhum tipo de erro sistemático;

- As aplicações feitas pelo ONS dos resultados obtidos com as simulações do modelo Eta, sugerem a necessidade de se estabelecer determinados conjuntos de parâmetros para cada região do país, de modo a se criar previsões “regionais”;
- Tal necessidade se faz pelo fato do ONS utilizar esta previsão para todo o país, sabendo que os sistemas atmosféricos que ocasionam precipitação se diferem de uma região para outra;
- Outros pontos que poderiam ser investigados para a melhoria do desempenho das previsões chuva-vazão seriam, por exemplo, o aumento da resolução espacial horizontal, uma melhor representação do tipo e uso do solo e a previsão por conjuntos.